

DERREX[®]

Produit réservé à l'usage professionnel
Product bestemd voor professioneel gebruik
Produkt für den professionellen Gebrauch bestimmt

Granulés anti-limaces (molluscicide) pour toutes cultures.
Slakkenkorrels (Molluscicide) in alle teelten.
Schneckenkorn (Molluskizid) für den Einsatz in allen Kulturen.

Matière active : 29,7 g/kg, 2,97 % w/w phosphate de fer (RB-appât prêt à l'emploi)
Actieve ingrediënten: 29,7 g/kg, 2,97 % w/w ijzerfosfaat (RB-Lokmiddel klaar voor gebruik)
Wirkstoff: 29,7 g/kg, 2,97 % w/w Eisen-III-Phosphat (RB-Fertigköder)

Netto-inhoud/Contenu net/Nettoinhalt: **10 kg**

Numéro d'autorisation/Toelatingsnummer/Zulassungsnummer: 9904P/B
Numéro d'agrément Lux. : L01953-015
Lotnummer/Numéro de lot/Chargennummer: zie verpakking/voir emballage

Producteur/Productent:

Progema GmbH
Blankschmiede 6
31855 Aerzen
Germany

Détenteur d'agrément/toelatinghouder/Zulassungshalter:

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
31860 Emmerthal
Germany

Centre antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum: 070 245 245

Luxembourg: (+352) 8002-5500.

Distribué par/verdeeld door/Vertrieb durch:

CERTIS Europe B.V.
Av. de Terveuren 270 Tervuerenlaan
1150 Bruxelles/Brussel



www.agrirecover.eu

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

EUH 401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

EUH 401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

In geval van nood: 0031-107 138 195

En cas d'urgence: 0033 172 110 003

Internal number: 1098-1250000674

Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin

Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoison: 070/245.245.
Lux. : En cas d'empoisonnement avéré ou suspecté, contacter le Centre Antipoison: (+352) 8002 5500.

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application

Derrex est un granulé anti-limaces utilisé dans toutes les cultures.
Utilisable en agriculture biologique.

Doses autorisées et mode d'application:

Dans toutes les cultures contre les limaces (Arionidae, Limacidae, Milacidae): 7 kg/ha, max. 4 applications/12 mois. Mesures de réduction du risque : zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Application : Derrex est un produit sous forme granulé avec comme matière active le phosphate de fer. Le produit peut être appliqué en toutes cultures régulières et biologiques. L'application doit être répétée par

temps favorable aux limaces. L'application préventive est indispensable pour les cultures continuellement infestées par les limaces. Il est déconseillé de mélanger Derrex avec des engrais à cause de la différence de taille des granulés. Une différence dans la taille des granulés peut conduire à une répartition irrégulière des granulés contre limaces, ayant comme conséquence que le traitement n'apporte pas le résultat désiré.

Attention : Pour la répartition de Derrex en cultures maraichères, ornementales ainsi qu'en cultures fruitières, veillez à ce que les granulés n'atterrissent pas dans les plantes. Derrex doit être épandu entre les plantes. Pour cette raison utiliser Derrex quand les plantes sont sèches.

Fonctionnement : Derrex est mangé par les limaces. Immédiatement après l'ingestion des granulés, la limace arrête de se gaver. Cet arrêt direct permet une protection immédiate de la culture. Après l'ingestion des granulés la limace se retire dans son abri naturel où elle meurt. C'est pour cette raison qu'il ne reste pas de limaces mortes entre les plantes. L'arrêt de la voracité de la limace ne va pas de pair avec une forte production visqueuse. Le produit n'a pas d'effets inacceptables sur les prédateurs naturels de la limace.

Période d'attente avant la récolte : aucune.

Remarques:

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
 - La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.
 - SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque).
- Fiche de sécurité, voir sur www.phytotrans.be

Instructions de stockage :

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
- Protéger contre le gel.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer précisément la quantité nécessaire à l'application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Aanwijzingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

Derrex is een slakkenkorrels (Molluscicide) in gebruik in alle teelten.

Bruikbaar in de biologische landbouw.

Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing:

In alle teelten tegen naaktslakken (Arionidae, Limacidae, Milacidae): 7 kg/ha, max. 4 toepassingen/12 maanden. Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Toepassing: Derrex is een bestrijdingsmiddel in granulaatvorm op basis van de werkzame stof ijzerfosfaat. Het mag toegepast worden in alle reguliere en biologische teelten. Bij slakkenbevorderende weersomstandigheden moet de toepassing herhaald worden. In gewassen waarbij de slakken zich continu in het gewas bevinden is een preventieve behandeling noodzakelijk. Er wordt afgeraden Derrex te mengen met meststoffen omwille van de korrelgrootte. Een verschil in korrelgrootte kan leiden tot een ongelijkmatige verdeling van de slakkenkorrels waardoor bestrijding dan niet het gewenste resultaat geeft.

Let op: Zorg ervoor dat bij het verdelen van Derrex bij blad-, sier- en fruitgewassen, de slakkenkorrels niet in het gewas terecht komen. Derrex dient tussen de planten gestrooid te worden. Pas Derrex daarom enkel toe op droog gewas.

Werking: Derrex wordt door de slakken opgevreten. Onmiddellijk na de opname van de korrels stoppen de slakken met vreten. Deze directe vraatstop leidt tot een onmiddellijke bescherming van de teelt. Na de vraatstop trekken de slakken zich terug in hun natuurlijke schuilplaatsen om te sterven. Daarom worden geen dode slakken teruggevonden. De optredende vraatstop gaat bovendien niet gepaard met sterke slijmvorming. Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op natuurlijke vijanden van de slak.

Wachttijd: Geen.

Opmerkingen:

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
 - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.
 - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).
- Veiligheidsinformatieblad, bekijk op www.phytotrans.be

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
- Beschermen tegen vorst.
- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Vernietiging van verpakking en behandelingsoverschotten

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden bij de daartoe voorzien inzamelpunten.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvoelstof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

423320