

# LATITUDE MAX<sup>®</sup>

CERTIS

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation/Zulassungsnummer: 10359 P/B  
Numéro d'agrément/Zulassungsnummer: L02059-037

FUNGICIDE/FONGICIDE



## Fungicide

Zaadbehandelingsmiddel ter bescherming van spelt, tarwe, gerst en triticale tegen de schimmelziekte 'halmroeter'.

## Fongicide

Traitement de semences pour la protection de l'épeautre, du froment, de l'orge et du triticale contre le piétin-échaudage.

## Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch

### Détenteur d'agrément/Erkenningshouder/Zulassungshalter:

Certis Europe B.V.

Avenue de Tervuren 270 Tervurenlaan

1150 Bruxelles/Brussel

Tel: 02 331 38 94

Latitude is een gedeponerd merk van/est une marque déposée de Mitsui & Co., Ltd

Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen./ Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi.

**Centre Antipoison pour Luxembourg :** (+352) 8002 5500

**Centre antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum:** 070 245 245



www.agrirecover.eu

## LATITUDE MAX<sup>®</sup>

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
P280: Beschermde handschoenen en beschermde kleding dragen.  
P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: Een arts raadplegen.  
EUH208: Bevat 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaan, chloride, 1-2-benzisothiazolin-3-one en bromopol. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Te vermelden co-formulanten: 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaan chloride, 1-2-benzisothiazolin-3-one en mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

H351 : Susceptible de provoquer le cancer.  
H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation.  
P280 : porter des gants de protection et des vêtements de protection.  
P308 + P313 : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.  
EUH208 : Contient 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaan, chloride, 1-2-benzisothiazolin-3-one et bromopol. Peut produire une réaction allergique.  
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Co-formulants à mentionner : 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane, du 1-2-benzisothiazolin-3-one et un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire- une réaction allergique.



**WAARSCHUWING/ATTENTION/  
ACHTUNG**

### Pour Luxembourg :

Le produit est toxique pour les organismes aquatiques. Sur base des applications autorisées de ce produit, il n'y a pas de risques pour les abeilles. Produit destiné à un usage professionnel.

### Actieve stof/Matière active:

silthiofam 125 g/l (11.83 % w/w): SG (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling, Suspension concentrée pour traitement des semences)

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.  
P308+P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

EUH208: Enthält 1(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaan chloride, 1-2-benzisothiazolin-3-one en mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

v2348050701 423657

Renseignements en cas d'urgence/Alarmnummer/Notrufnummer:  
+33 1 72 11 00 03/+31 10 713 8195/+49 69 222 25285

Lotnr/N° de lot: zie verpakking/voir emballage

20L

# LATITUDE MAX®

CERTIS

Toelatingsnummer/Numéro d'autorisation/Zulassungsnummer: 10359 P/B  
Numéro d'agrément/Zulassungsnummer: L02059-037

FUNGICIDE/FONGICIDE

Erkend gebruik, dosis en bijzondere gebruiksvoorwaarden.

## EEERSTE HULP MAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### NA INSLUKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### Opmerkingen voor de arts

**Prehospitaal:** symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het antigifcentrum +32 (0)70 245.245. Voor Luxemburg: (+352) 8002 5500

## LEGE VERPAKKINGEN

De lege verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk. Het bekomen spoelwater gebruiken voor zaadbehandeling volgens de etiketvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking dient door de gebruiker ingeleverd te worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. De verpakking mag in geen geval herbruikt worden.

## Gebruiksaanwijzing voor opslag :

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
  - Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
  - Beschermen tegen vorst.
  - Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

## WERKINGSMECHANISME EN EIGENSCHAPPEN VAN Latitude Max

Latitude Max bevat de actieve stof siltihofam. Het is een fungicide uit de chemische groep van "carboxamides", voor gebruik als zaadbehandelingsmiddel op zaden van spelt, tarwe, gerst en triticale.

Niet toepassen op brouwerijst. Latitude Max reduceert de nefaste effecten van de ziekte "tarwehalmdoder" in graan gewassen. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bodemschimmel *Gaeumannomyces graminis* var *tritici*. Het product laat toe de ziektesymptomen te reduceren (zwarte wortels) alsook het voorkomen van witte aren, hetgeen resulteert in een verhoogd rendement en een kwaliteitsverbetering van het graan. In het geval van sterke infectie kunnen de hierboven vermelde symptomen

van "tarwehalmdoder" worden waargenomen in het gewas. Latitude Max werkt in op het cellulaire energieproductieproces van de schimmel. Het werkingsmechanisme is verschillend van andere fungiciden als triazolen, een klasse moleculen met een bepaald niveau van bescherming tegen tarwehalmdoder.

Latitude Max vertoont excellente selectiviteit en compatibiliteit met andere zaadbehandelingsmiddelen (zie "Mengbaarheid"). Het kan worden toegepast in combinatie met andere zaadbehandelingen voor controle van andere ziekten. Latitude Max is perfect mengbaar met andere zaadbehandelingsmiddelen. Voor een goede controle is het noodzakelijk om Latitude Max in combinatie met andere zaadbehandelingsmiddelen toe te passen.

## AAANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

### Gebruiksdosis

zaaizaden van wintertarwe (*Triticum aestivum* (winter)), van zomerarwe (*Triticum aestivum* (winter)), van wintergerst (*Hordeum vulgare* (winter)), van zomergerst (*Hordeum vulgare* (spring)), van wintertriticale (*Triticum x Secale*), van zomertriticale (*Triticum x Secale*), van spelt (*Triticum spelta*). 200 ml product per 100 kg zaad.

Kwaliteit van het te behandelen zaad. De te behandelen zaden dienen van goede kwaliteit te zijn, goede kiemkracht vertonen en dienen te zijn bewaard onder goede omstandigheden.

### Toepassing

Gebruik aangepaste, goed afgestelde uitrusting voor een evenredige bedekking van het zaad. Latitude Max toepassen in een mengverhouding, waarvan tenminste 40 % water.

### Opslag van behandelde zaden

Zaad de met Latitude Max behandelde zaden in het seizoen waarin u ze gekocht heeft. Niettegenstaande dat Latitude Max geen kwalijke effecten heeft op het zaad tijdens de opslag ervan, kunnen de fysische condities tijdens opslag de levenskracht van het zaad en de werkzaamheid van Latitude Max negatief beïnvloeden. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden gedragen voor de werkzaamheid van met Latitude Max behandelde zaden, die overjaars werden bewaard.

### Resistentiemanagement

De ontwikkeling van resistentie is erg onwaarschijnlijk, doch niet fundamenteel onmogelijk. Indien resistentie zou ontstaan, kan Latitude Max geen voldoende bescherming bieden. Vanuit deze context wordt een proactieve strategie tegen resistentie-ontwikkeling aanbevolen, die niet toelaat méér dan drie opeenvolgende jaren in de rotatie de zaden van een gevoelig graan gewas op dezelfde site te behandelen met Latitude Max.

### Mengbaarheid

Latitude Max is mengbaar met andere zaadbehandelingsmiddelen. Voor verdere informatie over de compatibiliteit van Latitude Max met zaadbehandelingen consulteer uw verkoper. Guazatine-houdende middelen kunnen niet met Latitude Max gemengd worden. Opeenvolgende behandelingen moeten vermeden worden.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op *Aphidius thaliposphi*, *Typhlodromus pyri*, *Poecilus cupreus* en *Pardosa* spp.

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application.

## PREMIERS SOINS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

### EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

## Remarques pour le médecin

**Prise en charge:** traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons: +32 (0)70 245.245. Pour Luxembourg: (+352) 8002 5500

## EMBALLAGES VIDES

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau, suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression. Les eaux de nettoyage devront être utilisées pour traitement de semences selon les prescriptions sur l'étiquette. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Ne pas réutiliser l'emballage.

## Instructions de stockage :

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
- Protéger contre le gel.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

## Remarques :

SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

## MODE D'ACTION ET PROPRIETES DE Latitude Max

Latitude Max contient du siltihofam, un fungicide issu de la famille chimique des "carboxamides" et est utilisé sur épeautre, froment, orge et triticale en traitement de semences.

Ne pas utiliser en orge brassicole.

Latitude Max réduit les effets du piétin échaudage (*Gaeumannomyces graminis* var *tritici*), un champignon du sol à effet très néfaste sur les céréales. Ce produit permet de réduire la sévérité des attaques (racines noires) ainsi que l'incidence des épis blancs, ce qui se traduit par un gain de rendement ainsi qu'une amélioration de la qualité des grains. En cas de

fortes attaques, des symptômes de piétin échaudage (comme - précédemment cités) peuvent être observés dans la culture. Latitude Max agit sur la production en énergie des cellules du champignon. Son mode d'action est différent d'autres fungicides comme les triazoles, une famille fungicide connue pour démontrer un certain niveau d'efficacité contre le piétin échaudage.

Latitude Max démontre une excellente sélectivité et compatibilité avec les autres traitements de semences (Cf. "Compatibilité"). Il peut être coappliqué avec d'autres traitements de semences pour contrôler les maladies de semences. Il est parfaitement compatible avec d'autres traitements de semence. Il est impératif de l'utiliser en combinaison avec un autre traitement de semences pour contrôler les maladies de semences.

## CONDITIONS D'EMPLOI

### Dose d'application

Semences de froment d'hiver (*Triticum aestivum* (winter)), de froment de printemps (*Triticum aestivum* (winter)), d'orge d'hiver (*Hordeum vulgare* (winter)), d'orge de printemps (*Hordeum vulgare* (spring)), de triticale d'hiver (*Triticum x Secale*), de triticale de printemps (*Triticum x Secale*), d'épeautre (*Triticum spelta*).

200 ml de produit par quintal (100 kg) des semences.

### Qualité des semences à traiter

Les semences à traiter doivent posséder une bonne faculté et une bonne énergie germinative et avoir été conservées dans de bonnes conditions.

### Application

Utiliser un matériel de traitement adapté et bien réglé afin d'assurer une couverture régulière du produit sur les semences. Agiter avant l'emploi.

Appliquer Latitude Max dans un mélange proportionnel, dont au moins 40 % de l'eau.

### Stockage des semences traitées

Semer les semences traitées avec Latitude Max au cours de la saison d'achat. Bien que Latitude Max n'ait pas d'effet néfaste sur le stockage de semences traitées, la viabilité de ces semences ainsi que la performance de Latitude Max peuvent être négativement affectées par les conditions physiques de stockage. Aucune responsabilité ne peut alors être acceptée sur la performance de ces semences traitées conservées d'une année sur l'autre.

### Gestion des résistances

Le développement de résistance est peu probable mais ne peut pas être exclu. Si de telles souches résistantes apparaissent, Latitude Max ne pourra pas donner un niveau de contrôle satisfaisant. Dans ce contexte, une stratégie proactive de gestion des résistances est de ne pas traiter plus de trois années consécutives une céréale sensible sur un même site.

### Compatibilité

Contactez votre revendeur pour obtenir la liste des produits qui peuvent être appliqués avec Latitude Max. Les produits contenant de la guazatine ne peuvent pas être appliqués en mélange avec Latitude Max. Des traitements successifs doivent être évités.

Le produit ne cause aucun dommage à *Aphidius thaliposphi*, *Typhlodromus pyri*, *Poecilus cupreus* et *Pardosa* spp.

In geval van nood: 0031 107 138 195  
En cas d'urgence : 0033 172 110 003

Lotnr/N° de lot: zie verpakking/voir emballage

En product van/U produit de: v234805071  
Certis Europe B.V.  
Avenue de Tervuren 270 Tervurenlaan  
1150 Bruxelles/Brussel  
Tel: 02 331 38 94