

MIMIC®

CERTIS

Numéro d'agr ation/Erkenningsnummer/Zulassungsnummer: 8799P/B
Num ro d'agr ement Lux: L1924-37

INSECTICIDE

MIMIC®

Suspensie concentraat/uspension concentr e/Suspensionskonzentrat
content/bevat/enth lt TEBUFENOZIDE 240g/L or 23.2%w/w

Insecticide ter bestrijding van fruitmotje en vruchtschilvreter in hardfruit en van bladvreterende rupsen in vruchtgroenten en sierplanten.

GEVARENAANDUIDINGEN

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P280: Beschermende handschoenen en kleding dragen.

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

**Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.**

Insecticide pour le traitement des arbres fruitiers   p pins contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure et le traitement des l gumes-fruits sous protection et des plantes ornementales contre les chenilles d foliatrices.

MENTIONS DE DANGER

Tr s toxique pour les organismes aquatiques, entra ne des effets n fastes   long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 : Porter des gants et des v tements de protection.

P391 : Recueillir le produit r pandu.

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une r action allergique.

Respectez les instructions d'utilisation pour  viter les risques pour la sant  humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE

Sehr giftig f r Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMANAHMEN

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

P391: Versch ttete Mengen aufnehmen.

Enth lt 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zur Vermeidung von Risiken f r Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

Centre antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum: 070 245 245
Lux. : Centre Antipoison: (+352) 8002 5500

Insecticide ter bestrijding van fruitmotje en vruchtschilvreter in hardfruit en van bladvreterende rupsen in vruchtgroenten en sierplanten.

Insecticide pour le traitement des arbres fruitiers   p pins contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure et le traitement des l gumes-fruits sous protection et des plantes ornementales contre les chenilles d foliatrices

Voor details inzake gebruik en dosis en de aanwijzingen eerste hulp: zie bijsluiter.

Pour les d tails d'emploi et doses, pour les indications de premiers secours: voir notice.

  Gedeponeerd merk van/Marque d pos e de: Nippon Soda Co., Ltd.



www.agrirecover.eu

423166

Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer:
+31 10 713 8195/+33 1 72 11 00 03/
+49 69 222 25285

Distrib ur/Verdeeld door/Vertrieb durch:
Certis Europe B.V.
Av. de Tervueren 270
1150 Brussel/Bruxelles
02/331 38 94

D tenteur d'agr ation/Erkenningshouder/
Anerkennung Halter:
Nisso Chemical Europe
Berliner Allee, 42, 40212 D sseldorf
Germany

Lotnr/N  de lot:
zie verpakking/voir emballage

1L

MIMIC®

CERTIS

Número d'agrèation/Erkenningsnummer/Zulassungsnummer: 8799P/B
Numéro d'agrément Lux: L1924-37

INSECTICIDE

MIMIC®

Suspensie concentraat/uspension concentrée/Suspensionskonzentrat
content/bevat/enthält TEBUFENOZIDE 240g/L or 23.2%/w/w

Insecticide ter bestrijding van fruitmotje en vruchtschilvreter in hardfruit en van bladvreterende rupsen in vruchtgroenten en sierplanten.

GEVARENAANDUIDINGEN

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P280: Beschermende handschoenen en kleding dragen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

**Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.**

Insecticide pour le traitement des arbres fruitiers à pépins contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure et le traitement des légumes-fruits sous protection et des plantes ornementales contre les chenilles défoliatrices.

MENTIONS DE DANGER

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P280 : Porter des gants et des vêtements de protection.
P391 : Recueillir le produit répandu.

**Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.**

GEFAHRENHINWEISE

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

VORSICHTSMAßNAHMEN

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

**Enthält 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.**



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

Centre antipoisons/Antigifocentrum/Antigiftzentrum: 070 245 245
Lux. : Centre Antipoison: (+352) 8002 5500



www.agrirecover.eu

423166

MIMIC

Werkingsmechanisme

Mimic behoort tot de groep van insecten groeiregulatoren waarbinnen het een nieuw werkingsmechanisme heeft. De werkzame stof tebufenozide werkt door het vervellingshormoon (ecdyson) na te bootsen. Het vervellen van de insecten wordt zo gestoord dat ze niet normaal kunnen ontwikkelen en sterven.

Gebruik

Maximum 3 toepassingen per jaar voor alle gebruiken samen.

- Appelbomen en perenbomen: ter bestrijding van vruchtschilvreter (Capua reticulana (Adoxophyes orana)).

Dosis: 0,5 l/ha haag, 1 toepassing, volle bloei.

Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

- Appelbomen en perenbomen: ter bestrijding van fruitmotje (Cydia pomonella).

Dosis: 0,5 l/ha haag, bij het begin van de ontluiking van de eitjes.

Veiligheidsstermijn: 28 dagen.

Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek.

- Tomaat, paprika/spaanse peper, aubergine (onder bescherming): ter bestrijding van Tuta absoluta en van bladvreterende rupsen.

Dosis: 0,5 l/ha haag, 1-2 toepassingen.

Veiligheidsstermijn: 3 dagen.

- Sierplanten (niet bestemd voor consumptie): ter bestrijding van bladvreterende rupsen.

Dosis-concentratie: 50ml/100 l water.

Risicobeperkende maatregelen: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Gebruiksaanwijzing

Mimic dient bij gespoten te worden door middel van een spuitoplossing: - Schud de fles - Vul de tank drie kwart met water - Start het roeren en giet hoeveelheid product die nodig is in de tank - Na het vullen van de tank blijven roeren tot de toepassing gedaan is - Het spuitvolume aanpassen aan het volume van de vegetatie die behandeld wordt en de spuitapparatuur. Mimic kan gebruikt worden in alle types van spuitmachines.

Doeltreffendheid

Mimic werkt via orale opname door het insect en in mindere mate via contact: een egale

MIMIC

Mode d'action

Mimic appartient au groupe des régulateurs de croissance des insectes au sein duquel il présente un mode d'action original. Sa substance active tébufenozide agit de façon mimétique de l'hormone de mue (ecdysone). Les insectes dont la mue est ainsi perturbée ne peuvent plus se développer normalement et meurent.

Usages

Maximum 3 applications par an pour l'ensemble des usages.

- Pommier et poirier : pour lutter contre la tordeuse de la pelure (Capua reticulana (Adoxophyes orana)).

Dose : 0,5 l/ha haie, 1 application au stade pleine floraison.

Mesures de réduction du risque : zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

- Pommier et poirier : pour lutter contre le carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella).

Dose : 0,5 l/ha haie, application au début de l'éclosion des œufs.

Délai avant récolte : 28 jours.

Mesures de réduction du risque : zone tampon minimale de 3 m avec technique classique.

- Tomate, poivron/piment, aubergine (sous protection): pour lutter contre Tuta absoluta et contre les chenilles défoliatrices.

Dose : 0,5 l/ha haie, 1-2 applications.

Délai avant récolte : 3 jours.

- Plantes ornementales (non destinées à la consommation): pour lutter contre les chenilles défoliatrices.

Dose-concentration : 50ml/100 l d'eau.

Mesures de réduction du risque : zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Mode d'emploi

Mimic est destiné à être appliqué en pulvérisation après dilution dans l'eau: - Bien agiter le bidon - Remplir aux ¾ d'eau la cuve du pulvérisateur - Mettre en route l'agitation et verser dans la cuve la dose de produit nécessaire - Terminer le remplissage de la cuve et maintenir l'agitation jusqu'à la fin de l'application - Adapter le volume de bouillie en fonction du volume de végétation à traiter et du matériel de pulvérisation utilisé. Mimic peut être utilisé dans tous les types de pulvérisateurs.

1 (423166)

Renseignements en cas d'urgence/
Alarmnummer/Notrufnummer:

+31 10 713 8195/+33 1 72 11 00 03/
+49 69 222 25285

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
Certis Europe B.V.

Av. de Tervueren 270
1150 Brussel/Bruuxelles
02/331 38 94

Détenteur d'agrèation/Erkenningshouder/
Anerkennung Halter:

Nisso Chemical Europe
Berliner Allee, 42, 40212 Düsseldorf
Germany

Lotnr/N° de lot:

zie verpakking/voir emballage

1L

bedekking van de te beschermen teelt (vruchten, bladeren, ...) is daarom essentieel. Mimic heeft uitstekende nawerking tegen de larven van de Lepidoptera familie. Mimic heeft een uitstekende regenvastheid.

Aanbevelingen voor gebruik

Het succes van een toepassing met Mimic hangt sterk af van de toepassing. Het is daarom noodzakelijk dat het spuitvolume, de gebruikte druk bij het spuiten en de rijsnelheid tijdens de behandeling correct worden nageleefd om een regelmatige en volledige bedekking te bekomen van de bomen en vruchten.

Opmerkingen

Product bestemd voor beroepsgebruik.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in een programma van gefractioneerde toepassingen, in functie van de mate van het nagestreefde effect of de gevoeligheid van de cultivar. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor verhandeling van de behandelde vruchten te verkorten.

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op Encarsia formosa.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).

Vernietiging van verpakking en behandelingsoverschotten

De lege verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden. Het bekomen spoelwater moet verwijderd worden met respect voor de bestaande wetgeving terzake. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het middel, noch met de verpakking verontreinigen. De verpakking in geen geval hergebruiken voor een ander doel. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoel-einden.

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
- Beschermen tegen vorst.
- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Efficacité

Mimic agit par ingestion et, dans une moindre mesure, par contact: une couverture régulière de la partie à protéger (fruits, feuillage...) s'avère donc indispensable. Mimic possède une excellente persistance d'action contre les larves de lépidoptères. Mimic possède une excellente résistance au lessivage.

Recommandations d'emploi

La pulvérisation est un facteur de réussite des applications de Mimic. Il est donc nécessaire que le volume de bouillie, la pression de traitement et la vitesse d'avancement soient correctement réglés pour assurer une couverture régulière et complète des organes à protéger.

Remarques

Ce produit est réservé à un usage professionnel.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans un programme d'application fractionnée, selon l'ampleur de l'effet recherché ou la sensibilité du cultivar. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications ni celle de la période d'attente avant la commercialisation des fruits. SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Le produit est sélectif pour Encarsia formosa.

SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque)

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau. Les eaux de nettoyage devront être éliminées en respectant la législation en vigueur. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. Des examens approfondis ont démontré que le produit, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés.

Instructions de stockage :

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
- Protéger contre le gel.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Aanwijzingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.

Waarborg

Certis Europe B.V. garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het wettelijk toegelaten product Mimic overeenkomstig de formulering vermeld op het etiket. Certis Europe B.V. is echter niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van Mimic aangezien dit buiten onze controle ligt.

Indications pour les premiers secours et conseils pour le médecin

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin

Traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoison : 070/245.245.

Lux. : Centre Antipoison : (+352) 8002 5500.

Garantie

Certis Europe B.V. garantit uniquement la composition et le contrôle de la qualité du produit Mimic, produit légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette. Certis Europe B.V. n'est en aucun cas responsable des risques encourus lors du stockage et lors de l'utilisation et de la manipulation de Mimic puisque sans contrôle sur ceux-ci.