

NEMGUARD® GR

CERTIS

Numéro d'autorisation/Toelatingsnummer/Zulassungsnummer: 10885P/B

NEMATICIDE

NEMguard® GR

Granulaat/Granule/Granulat (GR)
Bevat/contient/enthält: knoflookextract/extract d'ail/
Knoblauchextrakt 450 g/kg - 45%/w/w

Gevarenaanduidingen

H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Mentions de danger

H315 : Provoque une irritation cutanée.
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.


Gefahrenhinweise

H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Vorsichtsmaßnahmen

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
P302+P352: BEI BERRÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam - mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Centre Antipoisons/Antigifocentrum/Antigiftzentrum: 070/245 245



Waarschuwing/Attention/
Achtung

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een frisse, droge en goed geventileerde plaats bewaren.
 - Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
 - Beschermen tegen vorst.
 - Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Product bestemd voor beroepsgebruik.
Produit réservé à l'usage professionnel.

Instructions de stockage:

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
 - Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
 - Protéger contre le gel.
 - Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Lire les instructions ci-jointes avant emploi.
Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.



424083

En cas d'urgence: +33 1 72 11 00 03
Alarmnummer: +31 10 713 8195
Notrufnummer: +49 69 222 25285

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder/Zulassungshalter:
Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
CERTIS EUROPE B.V.
Avenue de Tervuren 270 Tervurenlaan
B-1150 Bruxelles/Brussel
T: 02/331 38 94 - F: 02/331 38 60

Numéro de lot/Lotnummer : voir emballage/zie verpakking
Date de fabrication/Productiedatum: voir emballage/zie verpakking
© Marque enregistrée de/geregistreerd handelsmerk van EcoSpray Ltd.

20 KG

- Witloof et chicon rouge (forcerie en fosse)
- Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie) (plein air et sous protection)
- Chou de Bruxelles (plein air et sous protection)
- Chou-fleur (blanc et vert) (plein air et sous protection)
- Chou brocoli (plein air et sous protection)
- Chou Chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna (plein air et sous protection)
- Chou frisé (chou palmier) (plein air et sous protection)
- Chou-navet, rutabaga (plein air et sous protection)
- Aneth (consommation des feuilles) (plein air)
- Basilic (consommation des feuilles) et fleurs comestibles (consommation des fleurs) (plein air)
- Sariette des jardins (consommation des feuilles) (plein air)
- Mélisse (consommation des feuilles) (plein air)
- Estragon (consommation des feuilles) (plein air)
- Hysope (consommation des feuilles) (plein air)
- Cerfeuil (consommation des feuilles) (plein air)
- Cerfeuil musqué (consommation des feuilles) (plein air)
- Coriandre (consommation des feuilles) (plein air)
- Persil (consommation des feuilles) (plein air)
- Persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (plein air)
- Livèche (consommation des feuilles) (plein air)
- Origan/marjolaine (consommation des feuilles) (plein air)
- Menthe (consommation des feuilles) (plein air)
- Romarin (consommation des feuilles) (plein air)
- Sauge officinale (consommation des feuilles) (plein air)
- Thym (consommation des feuilles) (plein air)
- Fenouil (plein air)
- Oseille (consommation des feuilles) (plein air)

Stade d'application: Au semis et/ou à la plantation
 Pour lutter contre: Nématodes

Dose: 20 kg/ha, 1 application, incorporer au sol

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Culture

- Laitues (plein air)
- Endives, radicchio rosso, pain de sucre (plein air)

Stade d'application: Au semis et/ou au repiquage

Pour lutter contre: Nématodes

Dose: 20 kg/ha, 1 application, incorporer au sol

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Culture

- Fraisiers (champ de production) (plein air)
- Fraisiers (champ de sélection et de multiplication) (plein air)
- Ronces (mûres) (plein air)
- Groseilliers à maquereau et hybrides (plein air)
- Groseilliers (blancs, rouges, cassis) (plein air)
- Framboisiers (plein air)
- Myrtilles/airelles rouges (plein air)
- Kiwāi (kiwi de Sibérie) (plein air)
- Ail (plein air)
- Poireau (champ de production) (plein air)
- Echalote (plein air)
- Plantes ornementales à bulbes et à rhizomes (non destinées à la consommation) (plein air)

Stade d'application: A la plantation

Pour lutter contre: Nématodes

Dose: 20 kg/ha, 1 application, incorporer au sol

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque pour les jeunes pousses (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles), cresson alénois et autres jeunes pousses, pourpier, raifort, angélique, aneth, basilic, sariette des jardins, mélisse, estragon, hysope, cerfeuil, cerfeuil musqué, coriandre, persil, persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux, livèche, origan/marjolaine, menthe, romarin, sauge officinale, thym et oseille : Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Précautions d'emploi

Conserver NEMguard® GR dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière, à température ambiante, dans un endroit sec, aéré et fermant à clé. Pendant toute la durée de manipulation du produit et l'application, veiller à porter une tenue de protection adaptée. Après l'application, nettoyer les appareils de traitement sur le lieu même du travail.

Remarques :

- SP1: ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- SPe3: pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

- SPo2: laver tous les équipements de protection après utilisation.

- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Mesures de premiers secours

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarques pour le médecin

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons : 070/245 245.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Garantie

La société garantit exclusivement la composition et le contrôle de la qualité du produit légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette. La société n'est en aucun cas responsable des risques encourus lors du stockage et lors de l'utilisation et de la manipulation du produit vu le non contrôle de ceux-ci.

NEMGUARD® GR

Numéro d'autorisation/Toelatingsnummer/Zulassungsnummer: 10885P/B

NEMATICIDE

NEMguard® GR

Granulaat/Granule/Granulat (GR)
 Bevat/content/enthält: knoflookextract/extrait d'ail/
 Knoblauchextrakt 450 g/kg - 45%/w/w

Gevarenaanduidingen

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Mentions de danger

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Conseils de prudence

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Gefahrenhinweise

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Vorsichtsmaßnahmen

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas-/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.


P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
 P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam - mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Centre Antipoisons/Antigifcentrum/Antigiftzentrum: 070/245 245



Waarschuwing/Attention/Achtung

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een frisse, droge en goed geventileerde plaats bewaren.

- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.

- Beschermen tegen vorst.

- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Instructions de stockage:

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

- Protéger contre le gel.

- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.



En cas d'urgence: + 33 1 72 11 00 03
 Alarmnummer: +31 10 713 8195
 Notrufnummer: +49 69 222 25285

Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder/Zulassungshalter:
 Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
 CERTIS EUROPE B.V.
 Avenue de Tervuren 270 Tervurenlaan
 8-1150 Bruxelles/Brüssel
 T : 02/331 38 94 – F : 02/331 38 60

Numéro de lot/Lotnummer : voir emballage/zie verpakking
 Date de fabrication/Productiedatum: voir emballage/zie verpakking
 © Marque enregistrée de/geregistreerd handelsmerk van EcoSpray Ltd.

20 KG

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden

NEMguard® GR is een nematicide in microgranulaatvorm dat tijdens het zaaien en/of bij het planten wordt toegepast. Kan gebruikt worden in groentengewassen, besvruchten en kleinfruit, aromatische en medicinale kruiden en sierplanten. Het product wordt toegepast met een microgranulaatstrooier.

Bruikbaar in biologische landbouw.

Teelt

- Wortelen (*Daucus carota*) (open lucht en onder bescherming)
- Pastinaak (*Pastinaca sativa*) (open lucht en onder bescherming)
- Radijfs (*Raphanus sativus var. radicola*) (open lucht en onder bescherming)
- Rammenas en rettich (*Raphanus sativus var. niger*) (open lucht en onder bescherming)
- Schorseneren (*Scorzonera hispanica*) (open lucht en onder bescherming)
- Mierikswortel (*Armoracia rusticana*) (open lucht en onder bescherming)
- Veldsla (Valerianella locusta) (open lucht)
- Spinazie (*Spinacia oleracea*) (open lucht)
- Babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht)
- Drooggeooagste stamslabonen (zonder peul) (*Phaseolus vulgaris*) (open lucht)
- Stamslabonen (prinsessen-, srijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*) (open lucht en onder bescherming)
- Drooggeooagste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*) (open lucht)
- Groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*) (open lucht)
- Groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*) (open lucht en onder bescherming)
- Voedererwten (drooggeoogst) (*Pisum sativum subsp. arvense*) (open lucht)
- Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin,...) (drooggeoogst) (*Vicia faba*) (open lucht)
- Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*) (open lucht)
- Prei (zaaibed) (*Allium porrum*) (open lucht)
- Engelwortel (consumptie bladeren) (*Angelica sylvestris*) (open lucht en onder bescherming)
- Valeriaan (consumptie wortels) (*Valeriana officinalis*) (open lucht en onder bescherming)
- Cichorei (*Cichorium intybus var. sativum*) (open lucht)

Toepassingsstadium: Bij het zaaien

Ter bestrijding van: Aaltjes (nematoden)

Dosis: 20 kg/ha, 1 toepassing, inwerken in bodem

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Teelt

- Knolselder (*Apium graveolens var. rapaceum*) (open lucht en onder bescherming)
- Koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*) (open lucht en onder bescherming)
- Uien (drooggeooagste) (*Allium cepa*) (open lucht)
- Broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*) (open lucht en onder bescherming)
- Bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*) (open lucht en onder bescherming)
- Spruitkool (*Brassica oleracea var. gemmifera*) (open lucht en onder bescherming)
- Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*) (open lucht en onder bescherming)
- Chinese kool, paksoi, tatzoi en komatsuna (*Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis*) (open lucht en onder bescherming)
- Boerenkool (krulkool, palomboerenkool) (*Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia*) (open lucht en onder bescherming)
- Tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*) (open lucht)
- Slasoorten (*Lactuca sp.*) (open lucht)
- Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (*Cichorium endivia var latifolia et crispum*) (open lucht)
- Witloof en roodloof (*Cichorium intybus var. foliosum*) (forcerie grondteelt)
- Warmoes (snijbiet) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens*) (open lucht)
- Selderij (bleek-, groene en witte) (*Apium graveolens var. dulcè*) (open lucht)
- Knolvenkel (*Foeniculum vulgare*) (open lucht)
- Rabarber (*Rheum rhabarbarum*) (open lucht)
- Dille (consumptie bladeren) (*Anethum graveolens*) (open lucht)
- Kervel (consumptie bladeren) (*Anthriscus cerefolium*) (open lucht)
- Koriander (consumptie bladeren) (*Coriandrum sativum*) (open lucht)
- Lavas, maggiplant (consumptie bladeren) (*Levisticum officinale*) (open lucht)
- Roomse kervel (consumptie bladeren) (*Myrrhis odorata*) (open lucht)
- Peterselie (consumptie bladeren) (*Petroselinum crispum*) (open lucht)
- Wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum var. tuberosum & Chaerophyllum bulbosum*) (open lucht)
- Dragon (consumptie bladeren) (*Artemisia dracunculus*) (open lucht)
- Hysop (consumptie bladeren) (*Hyssopus officinalis*) (open lucht)

- Citroenmelisse (consumptie bladeren) (open lucht) (*Melissa officinalis*) (open lucht)
- Munt (consumptie bladeren) (*Mentha sp.*) (open lucht)
- Basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (Ocimum basilicum and edible flowers) (*Ocimum basilicum*) (open lucht)
- Marjolein/oregano (consumptie bladeren) (*Oreganum spp.*) (open lucht)
- Salie (consumptie bladeren) (*Salvia officinalis*) (open lucht)
- Bonenkruid (consumptie bladeren) (open lucht)
- Tijm (consumptie bladeren) (Thymus sp.) (*Satureja hortensis*) (open lucht)
- Rozemarijn (consumptie bladeren) (*Rosamarinus officinalis*) (open lucht)
- Zuring (consumptie bladeren) (*Rumex acetosa*) (open lucht)
- Postelein (consumptie bladeren) (*Portulaca oleracea*) (open lucht)

Toepassingsstadium: Bij het zaaien en/of bij het planten

Ter bestrijding van: Aaltjes (nematoden)

Dosis: 20 kg/ha, 1 toepassing, inwerken in bodem

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Teelt

- Aardbeien (productieveld) (open lucht)
- Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht)
- Braamstruiken (*Rubus fruticosus*) (open lucht)
- Frambozenstruiken (*Rubus idaeus*) (open lucht)
- Blauwe/rode bosbessen (*Vaccinium myrtillus & V. corymbosum*) (open lucht)
- Aalbessen (witte, rode, zwarte) (*Ribes spp.*) (open lucht)
- Stekelbes (kruisbes) en kruisingen (*Ribes uva-crispa*) (open lucht)
- Kiwibes (*Actinidia arguta*) (open lucht)
- Knoflook (*Allium sativum*) (open lucht)
- Sjalot (*Allium cepa Aggregatum types*) (open lucht)
- Prei (productieveld) (*Allium porum*) (open lucht)
- Bol- en knolgewassen, rhizomen (sierplanten) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Toepassingsstadium: Bij het planten

Ter bestrijding van: Aaltjes (nematoden)

Dosis: 20 kg/ha, 1 toepassing, inwerken in bodem

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Opmerking voor mierikswortel, tuinkers en andere kiemen en scheuten, babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren), dille, engelwortel, kervel, koriander, lavas, maggiplant, roomse kervel, peterselie, wortelpeterselie en wortelkervel, hysop, dragon, citroenmelisse, munt, basilicum, marjolein/oregano, salie, bonenkruid, tijm, rozemarijn, zuring en postelein : Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Voorzorgsmaatregelen

Houd NEMguard® GR in de originele verpakking, goed gesloten, beschermd tegen licht en bij kamertemperatuur in een droge, geventileerde en afsluitbare ruimte. Tijdens de gehele duur van de toepassing, draag altijd geschikte beschermende kledij. Na de toepassing de granulaatstrooier reinigen op de plaats zelf.

Opmerkingen:

- SP1: zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo2: was alle beschermende kleding na gebruik.
- SPe3: om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Eerste Hulp

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Eerste-hulprichtlijn

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding

wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245 245

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Garantie

De firma garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het wettelijk toegelaten product overeenkomstig de formulering vermeld op het etiket. De firma is echter niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van het product aangezien dit buiten onze controle ligt.

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application
NEMguard® GR est un nématicide microgranulé, à utiliser au moment du semis et/ou de la plantation sur les cultures légumières, les baies et les petits fruits, les plantes aromatiques et médicinales, et les plantes ornementales. Le produit s'applique dans la raie de semis ou de plantation à l'aide d'un microgranulateur.

Utilisable en agriculture biologique.

Culture

- Mâche (plein air)
- Epinard (plein air)

- Jeunes pousses (récoltées jusqu'au stade 8 vraies feuilles) (plein air)
- Haricot récolté sec (sans cosse) (plein air)
- Haricot vert (récolté frais, avec cosse) (plein air et sous protection)
- Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air)
- Fèves et féveroles (récoltées sèches) (plein air)
- Pois verts (avec cosse) (mange-tout) (plein air et sous protection)
- Petit pois (sans cosse) (plein air)
- Pois fourragers (récoltés secs) (plein air)
- Pois récoltés secs (sans cosse) (plein air)
- Carottes (plein air et sous protection)
- Panais (plein air et sous protection)
- Poireau (pépinière) (plein air)
- Radis (plein air et sous protection)
- Radis noir et radis rave (plein air et sous protection)
- Scorsonère (plein air et sous protection)
- Raifort (plein air et sous protection)
- Angélique (consommation des feuilles) (plein air et sous protection)
- Valériane (consommation de la racine) (plein air et sous protection)
- Chicorée (plein air)

Stade d'application: Au semis
Pour lutter contre: Nématodes
Dose: 20 kg/ha, 1 application, incorporer au sol
Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Culture

- Rhubarbe (plein air)
- Fenouil (plein air)
- Céleri (à côtes, blanc et vert) (plein air)
- Céleri-raves (plein air et sous protection)
- Cresson alénois et autres jeunes pousses (plein air)
- Bette (plein air)
- Pourpier (consommation des feuilles) (plein air)
- Oignons (récolté sec) (plein air)