

VERSILUS®

CERTIS
Growing Together

Numéro d'autorisation/Toelatingsnummer/Zulassungsnummer: 10831P/B

FUNGICIDE/FONGICIDE



Versilus®

Water dispergeerbaar granulaat/Granulés à disperser dans l'eau/Wasserdispersierbares Granulat (WG)
Bevat/contient/enthält benthiavalicarb 15 % w/w

Gevarenaanduidingen

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen

P260: Stof en spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en gelaatsbescherming dragen.
P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie

EUH208: Bevat benthiavalicarb-isopropyl en natriumignosulfonaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Mentions de danger

H351: Susceptible de provoquer le cancer.
H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de prudence

P260: Ne pas respirer les poussières et les brumes de pulvérisation.
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection du visage.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Informations additionnelles

EUH208: Contient du benthiavalicarb-isopropyle et du lignosulfonate de sodium. Peut produire une réaction allergique.
EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Gefahrenhinweise

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.


Sicherheitshinweise

P260: Staub und Aerosol nicht einatmen.
P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Gesichtsschutz tragen.
P308+P313: Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH208: Enthält Benthiavalicarb-isopropyl und Natriumignosulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Centre antipoisons/Antigifocentrum/Antigiftzentrum: 070/245 245



GEVAAR/DANGER/
GEFAHR

v2351011501 430710

Product bestemd voor beroepsgebruik/ Produit réservé à l'usage professionnel.

Lire les instructions ci-jointes avant emploi/Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Distribué par/Verdeeld door/Vertrieb durch:
Détenteur d'autorisation/Toelatingshouder/Zulassungsinhaber:
CERTIS EUROPE B.V.
Avenue de Tervuren 270 Tervurenlaan
B-1150 Bruxelles/Brussel
T: 02 331 38 94

3KG

Gebruik

Aardappelen en aardappelootgoedteelt (open lucht) (*Solanum tuberosum*)

Ter bestrijding van phytophthora

Dosis: 0,5 kg/ha, 1-8 toepassingen met een interval van min. 5 dagen

Veiligheidsstermijn: 3 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Opmerkingen

- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvoestof is opgedroogd.
- SPa3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De FRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 40.
- De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn te verkorten.

Eerste-hulpmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.

Lege verpakkingen en spuitoverschotten

De zorgvuldig geleidelijke verpakking van dit product dient door de gebruiker ingeleverd te worden bij de daartoe voorzien inzamelputten.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Om spuitoverschotten na de behandeling te verwijderen, moet de benodigde hoeveelheid spuitvoestof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

Garantie

De firma garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het wettelijk toegelaten product overeenkomstig de formulering vermeld op het etiket. De firma is echter niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van het product aangezien dit buiten onze controle ligt.

Gebruiksaanwijzing voor opslag:

- Op een frisse, droge en goed geventileerde plaats bewaren.
- Gebruik de originele containers, goed afgesloten.
- Beschermen tegen vorst.
- Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

Usages:

Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air) (*Solanum tuberosum*)

Pour lutter contre le mildiou (*Phytophthora infestans*)

Dose: 0,5 kg/ha, 1-8 applications à intervalle d'au moins 5 jours.

Délai avant récolte: 3 jours.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

Remarques:

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
- SPa3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code FRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 40.
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai d'attente.

Conseils de premiers secours

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés. Verver abundantement à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin

Remarques pour le médecin

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

Emballages vides et surplus de traitement

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer précisément la quantité nécessaire à l'application du produit en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

Garantie

La société garantit exclusivement la composition et le contrôle de la qualité du produit légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette. La société n'est en aucun cas responsable des risques encourus lors du stockage et lors de l'utilisation et de la manipulation du produit vu le non contrôle de ceux-ci.

Instructions de stockage:

- Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.
- Protéger contre le gel.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

v2351011501 430711

En cas d'urgence: + 33 1 72 11 00 03

Alarmnummer: + 31 10 713 8195

Notrufnummer: + 49 69 222 25285

Lotnr./Numéro de lot - Productiedatum/Date de fabrication:
zie verpakking/voir emballage.

© Gedeponeerd merk van/Marque déposée de Certis Europe BV